

## SCHEDA TECNICA

### 1. NOME COMMERCIALE: **EROGATORI DI FEROMONI PER PARASSITI DELLA PATATA**

Erogatore di feromoni da utilizzare in combinazione con la trappola Yatlorf (da acquistare separatamente) per il monitoraggio di ferretti (coleotteri elateridi).

Monitoring device da impiegare per mantenere una regolare sorveglianza degli infestanti presenti in giardini ed orti domestici per un periodo di tempo definito.

### 2. CODICE PRODOTTO: **P-25011ABAINKIT, P-25011ALAINKIT, P-25011ASAINKIT**

### 3. IMMAGINI PRODOTTO:



Dispenser erogatore

P-25011ABAINKIT

P-25011ALAINKIT

P-25011ASAINKIT

### 4. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dispenser erogatori di feromoni per il monitoraggio di coleotteri elateridi. Utilizzare gli erogatori con Yatlorf (venduta separatamente), la trappola per parassiti delle patate.

**I kit sono specie-specifici e venduti separatamente:**

- P-25011ABAINKIT: per *Agriotes brevis*
- P-25011ALAINKIT: per *Agriotes litigiosus*
- P-25011ASAINKIT: per *Agriotes sordidus*

**Colore:** come da immagine riportata

I prodotti InVerde potrebbero subire, in qualsiasi momento e senza preavviso ai clienti, modifiche tecniche ritenute necessarie od opportune.

### 5. MODALITÀ D'USO:

Posizionare l'erogatore di feromone nella trappola Yatlorf (acquistabile separatamente), seguendo le istruzioni d'uso della trappola. Inserire l'erogatore di feromone specifico a seconda del target che si vuole monitorare e seguendo il calendario consigliato:

Fine marzo/inizio aprile: inserire *Brevis*

Inizio aprile: aggiungere *Sordidus*

Inizio di maggio: rinnovare *Sordidus*

Fine maggio: sostituire *Brevis* con *Litigiosus*

## SCHEDA TECNICA

Metà giugno: rinnovare *Litigiosus*

Inizio agosto: fine monitoraggio.

Gli erogatori hanno una durata di 4-5 settimane.

**Periodo di monitoraggio consigliato:** tra marzo e agosto.

**Condizioni di stoccaggio:** Conservare in luogo fresco (a temperature inferiori ai 25 °C) e asciutto (umidità relative inferiori al 55%).

In condizioni ottimali di stoccaggio il prodotto in confezione integra dura 3 anni.

### 6. CONFEZIONE E RICAMBI:

P-25011ABAINKIT: 1 erogatore per *Agriotes brevis*

P-25011ALAINKIT: 2 erogatori per *Agriotes litigiosus*

P-25011ASAINKIT: 2 erogatori per *Agriotes sordidus*

### 7. SMALTIMENTO:

Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente.