

SCHEDA TECNICA

1. NOME COMMERCIALE: YATLORF

Dispositivo di monitoraggio per rilevare la presenza di larve di coleotteri elateridi (ferretti) da utilizzare unitamente agli specifici erogatori per *Agriotes brevis*, *A. litigiosus*, *A. sordidus* (acquistabili separatamente).

Monitoring device da impiegare per mantenere una regolare sorveglianza degli infestanti presenti in giardini e orti domestici per un periodo di tempo definito.

2. CODICE PRODOTTO: P-25011AIN

3. IMMAGINE PRODOTTO:



4. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Yatlorf è un dispositivo di monitoraggio consistente in un corpo trappola in plastica da associare a specifici erogatori per elateridi (da acquistare separatamente).

Il prodotto è composto da:

- un corpo trappola in plastica dura da assemblare (erogatori non inclusi)

Colore: come da immagine riportata

I prodotti InVerde potrebbero subire, in qualsiasi momento e senza preavviso ai clienti, modifiche tecniche ritenute necessarie od opportune.

5. MODALITÀ D'USO:

La trappola Yatlorf deve essere attivata con uno o più erogatori di feromoni (da acquistare separatamente) a seconda delle specie target da monitorare.

Inserire l'erogatore di feromone nella trappola. Sulla base del periodo dell'anno e della specie che si vuol monitorare, seguire il calendario consigliato nella figura sottostante.

SCHEDA TECNICA

PERIODO	FEROMONE
Fine Marzo / Inizio Aprile	Inserire <i>Brevis</i>
Inizio Aprile	Aggiungere <i>Sordidus</i>
Inizio Maggio	Rinnovare <i>Sordidus</i>
Fine Maggio	Sostituire <i>Brevis</i> con <i>Litigiousus</i>
Metà Giugno	Rinnovare <i>Litigiousus</i>
Inizio Agosto	Fine Monitoraggio

Collocare Yatlorf in giardini ed orti domestici per il monitoraggio di elateridi, nel periodo compreso da marzo ad agosto. Collocare il dispositivo a terra, interrando la parte basale come riportato nella foto sottostante. Gli erogatori hanno una durata di 4-5 settimane.



Area di copertura teorica: posizionare una trappola per orto/giardino domestico.

Periodo di monitoraggio consigliato: tra marzo e agosto.

Frequenza controlli consigliata: settimanale. Gli erogatori hanno una durata di 4-5 settimane.

Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo fresco (a temperature inferiori ai 25 °C) e asciutto (umidità relative inferiori al 55%).

6. CONFEZIONE E RICAMBI:

Confezione:

Una confezione contiene una trappola (erogatori non inclusi)

Ricambi:

Erogatori da utilizzare unitamente a Yatlorf (da acquistare separatamente):

- Erogatore *Agriotes brevis*
- Erogatore *Agriotes litigiousus*
- Erogatore *Agriotes sordidus*

7. SMALTIMENTO:

Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente.